

Reduzierung des Infektionsdrucks

Avidress Plus

Senkt den pH-Wert des Trinkwassers und mindert so das Infektionsrisiko:
täglich 5 ml pro 1 Liter Trinkwasser

Stärkung des Immunsystems

Immunbooster

Fördert die Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit des Immunsystems, die Tauben werden in Stressphasen unterstützt:
2-3 x pro Woche 10 g für ca. 20 Tauben

... bei Ausbruch der JTK

Avitestin

Zur weiteren Keimreduzierung und dem gleichzeitigen Aufbau einer wieder intakten Darmflora:
5 ml pro 1 Liter Trinkwasser für 7 Tage

UsneGano

Die ätherischen Öles des Bartflechten Oregano Mix haben eine keimreduzierende Wirkung und fördern die Verdauungstätigkeit:
2-3 x pro Woche 3 ml pro 1 Liter Trinkwasser

Entrobac

Probiotische Bakterien und spezielle Prebiotika unterstützen eine optimale Besiedelung der Darmflora und damit auch eine gesunde Darmflora:
5 g je Kilogramm Futter für ca. 2 Tage

UsneGano

Zur weiteren Keimreduzierung und dem gleichzeitigen Aufbau einer wieder intakten Darmflora:
3 ml pro 1 Liter Trinkwasser für 7 Tage

Avibac Stabilizer

Probiotischer Reiniger für eine gesunde Mikroflora im Schlag. Pathogene Bakterien werden in ihrer Vermehrung gehemmt und reduziert:
100 ml Avibac auf 50 m²/ normal belastete Schläge
1-2 mal/ Woche, schwer belastete täglich

Avitestin

Hochwertige mittelkettige Fettsäuren fördern das Wachstum körpereigener Probiotika. Die enthaltene Buttersäure fördert zudem das Wachstum der Darmzotten:
2-3 x pro Woche 5 ml je 1 Liter Trinkwasser bei den abgesetzten Jungtieren

Entrobac

Zur weiteren Keimreduzierung und dem gleichzeitigen Aufbau einer wieder intakten Darmflora:
10 g pro 1 Liter Trinkwasser für 7 Tage



Die Tauben dürfen damit auch benetzt werden!



ACHTUNG: Sollte der Verlauf der Jungtierkrankheit extrem ausfallen, sollte man immer einen qualifizierten Tierarzt aufsuchen!

Die JTK verläuft milder, wenn den Tieren während der ersten 3 Tage jegliches Futter gestrichen wird. Ab dem 4. Tag Immunbooster zusammen mit einem leicht verdaulichen Futter geben. Wir empfehlen den Immunbooster zusätzlich mit 1 Esslöffel Moorgold pro Kilogramm Futter abzubinden!

TIPP: Die Züchter berichteten in diesem Jahr auch von dem Problem, dass die Tiere teilweise die Aufnahme von Wasser einstellten. Hier ist es von besonders großer Bedeutung schnell zu reagieren, da sonst ein Austrocknen der Tiere droht und damit verbunden der Verlust.

Eine Kombination aus Avitestin, UsneGano und Entrobac gelöst in lauwarmem Wasser und den Tieren mit Hilfe einer Futterspritze direkt in den Schnabel gespritzt (2x 15 ml je Tier / Tag) hat sich als besonders wirksam erwiesen. Die Tiere fingen nach 2-3 Tagen wieder an selbstständig zu saufen.